

白云山®

OTC
乙类
外

对乙酰氨基酚栓说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

【药品名称】

通用名称：对乙酰氨基酚栓

英文名称：Paracetamol Suppositories

汉语拼音：Duiyixian'anjifen Shuan

【成份】每粒含对乙酰氨基酚0.15克。辅料为半合成脂肪酸甘油酯。

【性状】本品为乳白色至微黄色栓。

【作用类别】本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。

【规格】0.15克

【用法用量】直肠给药。将药栓单个撕开(见图1)，再从塑料片分离处撕开取出药栓(见图2)，患者取侧卧位，将药栓塞入肛门内。1~6岁儿童一次1粒，若持续发热或疼痛，可间隔4~6小时重复用药一次，24小时内不超过4粒。

【不良反应】1.偶见皮疹。有报道，极少数患者使用对乙酰氨基酚可能出现致命的、严重的皮肤不良反应。2.过量使用对乙酰氨基酚可引起严重肝损伤。3.偶见荨麻疹、药热及粒细胞减少。4.长期大量用药会导致肾功能异常。

【禁忌】1.严重肝肾功能不全者禁用。2.对本品过敏者禁用。

【注意事项】1.本品为对症治疗药，用于解热连续使用不超过3天，用于止痛不超过5天，症状未缓解请咨询医师或药师。2.1岁以下儿童应在医师指导下使用。3.对阿司匹林过敏者慎用。4.不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品(如某些复方抗感冒药)。5.肝肾功能不全者慎用。6.使用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。7.过敏体质者慎用，对本品过敏者禁用。8.本品性状发生改变时禁止使用。9.请将本品放在儿童不能接触的地方。10.儿童必须在成人监护下使用。11.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。12.本品在高气温下受热易熔化变形，但稍有变形、变软并不影响疗效，仍可将药栓冷冻后再撕开使用。13.当出现皮疹或过敏反应的其他征象时，如用药后出现瘙痒、皮疹，尤其出现口腔、眼、外生殖器红肿、糜烂等，应立即停药并咨询医生。14.因过量使用对乙酰氨基酚有引起严重肝损伤的报道，应严格按说明书使用。用药期间如发现肝生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能与肝损伤有关的临床表现时，应立即停药并就医。建议对乙酰氨基酚口服一日最大量不超过2克。15.应尽量避免合并使用含有对乙酰氨基酚或其他解热镇痛药的药品，以避免药物过量或导致毒性协同作用。

【药物相互作用】1.应用巴比妥类(如苯巴比妥)或解痉药(如颠茄)的患者，长期应用本品可致肝损害。2.本品与氯霉素同用，可增强后者的毒性。3.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品能抑制前列腺素合成，具有解热镇痛作用。

【贮藏】密封，在阴凉处保存(不超过20℃)。

【包装】药用聚乙烯聚氯乙稀复合片材包装。每盒装10粒。

【有效期】24个月。

【执行标准】《中国药典》2020年版二部。

【批准文号】国药准字H44024867

【说明书修订日期】2020年12月30日

【药品上市许可持有人】

名称：广州白云山敬修堂药业股份有限公司

注册地址：广州市荔湾区人民南路179号

咨询热线：4000011790

网址：http://www.jxt.com.cn

【生产企业】

企业名称：广州白云山敬修堂药业股份有限公司

生产地址：佛山市南海区黄岐鄱阳路249号

咨询热线：4000011790

邮政编码：510130

传真号码：(020)81157740

邮政编码：528248

传真号码：(020)81157740

如有问题可与生产企业联系



广药白云山

广州白云山敬修堂药业股份有限公司