

小儿布洛芬栓说明书

OTC

外

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：小儿布洛芬栓

英文名称：Paediatric Ibuprofen Suppositories

汉语拼音：Xiaoer Buluofen Shuan

【成份】本品主要成份为布洛芬50毫克。辅料为混合脂肪酸甘油酯。

【性状】本品为脂肪性基质制成的白色或乳白色栓。

【作用类别】本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。

【规格】50毫克

【用法用量】直肠给药：1-3岁儿童，一次1粒（塞肛门内）。若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次。

【不良反应】1. 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。

2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

【禁忌】1. 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。2. 对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。

【注意事项】

1. 本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用于止痛不得超过5天，用于解热不得超过3天，症状不缓解，请咨询医师或药师。

2. 有下列情况患者慎用：支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍（如血友病）。

3. 下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压。

4. 1岁以下儿童应在医师指导下使用。

5. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。

6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7. 本品性状发生改变时禁止使用。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

9. 儿童必须在成人监护下使用。

10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

11. 如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊等情况，应停药并咨询医师。

12. 第一次使用本品如出现皮疹或过敏症状，应停药并咨询医师。

【药物相互作用】

1. 本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的不良反应，并可能导致溃疡。

2. 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。

3. 本品与地高辛、甲氧蝶呤、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。

4. 本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也可降低后者的降压效果。

5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品能抑制前列腺素的合成，具有解热镇痛及抗炎作用。

【贮藏】遮光，密封，在阴凉（不超过20℃）干燥处保存。

【包装】PVC栓壳包装 6枚×1板/盒 8枚×1板/盒 内附指套。

【有效期】24个月

【执行标准】国家药品标准YBH00772013

【批准文号】国药准字H20133068

【说明书修订日期】2020年10月19日

【上市许可持有人】

名称：山西同达药业有限公司

注册地址：大同市经济开发区第一医药工业园区

【生产企业】

企业名称：山西同达药业有限公司

生产地址：山西省大同市经济技术开发区第一医药园区

邮政编码：037300

电话号码：0352-5334999

传真号码：0352-5394333

如有问题可与生产企业联系



山西同达药业有限公司
SHANXI TONGDA PHARMACEUTICAL CO., LTD.